

## Communications.

### Description d'un nouvel *Urodon* paléarctique

[COL. ANTHRIBIDAE]

par le Dr Karl DANIEL.

***Urodon sinaiticus*** (<sup>1</sup>), n. sp. — ♂. *Subovatus, convexus, nigropiceus, dense pallide silaceo-pubescent, antennis pedibusque rufo-testaceis, illarum clava apice infuscata; capite plano, oculis modice convexis, antennis sat brevibus, articulis 2 primis incrassatis, 3<sup>e</sup> elongato, latitudine plus duplo longiore, sequentibus longitudine gradatim decrescentibus, 8<sup>o</sup> 7<sup>o</sup> perspicue angustiore, clava triarticulata, manifeste abrupta; pronoto latitudine longiore, lateribus postice parum, medio sat cum apice rotundato, angulis posticis vix productis, lobo basali nec truncato, nec acuminato, scutellum minutulum occultante; elytris pronoto evidenter latioribus, basi recte truncatis, lateribus ab humeris subrectis usque ad tertiam partem apicalem parallelis, apice singulatim rotundatis, lineis culris nullis, sculptura vestitura totaliter occulta; pygidio medio longitudinaliter sulcato; sternito abdominali ultimo intra lobos laterales, ut in *U. rufipes* Ol. *formatos*, calvo; pedibus sat gracilibus, tibiis anticus subrectis, posticis leviter bisinuatis, femoribus posticis obtuse dentatis.*

Long. : 2,5 mill., lat. : 1 mill.

Patria : Sinaï mons.

Cette espèce diffère de toutes ses congénères par les fémurs postérieurs subdentés. A première vue, elle ressemble beaucoup à un très petit *U. rufipes* Ol., mais elle s'en distingue, outre le caractère essentiel indiqué, par le lobe basal du pronotum arrondi, au lieu d'être subtronqué, ainsi que par la couleur et la densité de la pubescence. Les pattes sont entièrement d'un rouge testacé, tandis que les cuisses postérieures de l'*U. rufipes* sont presque toujours obscurcies.

2♂ : Aoual Heibeh (Sinaï), 25 févr. 1902, sur un grand *Reseda* (P. DE PEYERIMHOFF).

---

(1) « *Urodon rufipes* Ol. (minor) » (P. DE PEYERIMHOFF, Liste des Coléoptères du Sinaï, in *L'Abeille*, XXXI, p. 41).